

Буклет

Для родителей

Как прививки защищают детей

Статистика, вакцины,
рекомендации,
ваш личный график




График вакцинации ребенка

Название прививки	Кратность	Дата проведения	Комментарии
Коклюш, дифтерия, столбняк			
Корь			
Краснуха			
Паротит			
Полиомиелит			
Гепатит В			
Пневмококк			
Менингококк			
Грипп			

Все вакцины безопасны и эффективны:

- все вакцины лицензированы;
- прошли многоступенчатую проверку;
- перевозятся под жестким контролем непрерывности холодовой цепи;
- эксперты анализируют и учитывают осложнения и реакции на вакцинацию;
- иммунизация проводится только при отсутствии противопоказаний.



Линия сгиба

e.doumed.ru

Линия сгиба

Привитые дети меньше болеют

- Вакцинация не дает стопроцентной гарантии, что ребенок не заболееет, но у привитых детей заболевание протекает в легкой форме.
- Вакцинация снижает частоту и тяжесть осложнений.
- Среди привитых детей снижается циркуляция возбудителей.

Статистика за 2020 год

Вакцинация снизила число

заболеваний: инфекционным паротитом – в 2,2 раза, ветряной оспой – в 2,6 раз, гепатитом А – в 2 раза, туберкулезом – на 14,6%, гриппом – на 24,2%, клещевым энцефалитом – на 11,6%, гепатитом В – на 22%.

Отказ от вакцинации привел к росту заболеваемости:

коклюшем – в 1,9 раз,
корью – в 3,5 раза,
менингококком – на 19,3%.

Линия сгиба

Как ухаживать за ребенком после инактивированной прививки

Первые трое суток наблюдайте за состоянием и поведением ребенка. Если у него температура поднимается до 38,5 °С и выше, место укола больше 5 см в диаметре, отмечается общее ухудшение состояния, непривычное поведение ребенка, нужно незамедлительно обратиться к врачу. Но это не осложнения прививки.

Как ухаживать за ребенком:

- при легком недомогании дайте жаропонижающий препарат в возрастной дозировке;
- если температура выше 38,5 и место укола больше 5 см в диаметре, вызовите скорую помощь

От каких заболеваний делают инактивированные прививки:

коклюш, дифтерия, столбняк, инактивированный полиомиелит, вирусный гепатит В, пневмококк, менингококк, гепатит А, клещевой энцефалит, гемофильная инфекция

Линия сгиба

Как ухаживать за ребенком после получения им живой полиомиелитной вакцины

Две недели после вакцинации контролируйте состояние здоровья и поведение ребенка. Температура может подниматься не выше 38 °С.



Как ухаживать за ребенком:

- в течение 60 дней не разрешайте общаться с непривитыми детьми;
- в день вакцинации ограничьте прогулки и водные процедуры;
- избегайте общественных мест, чтобы свести к минимуму риск контакта с инфекциями;
- не давайте новые продукты, чтобы избежать аллергических реакций.

От каких заболеваний

делают прививки живой вакциной: корь, краснуха, паротит, ВПЧ-М, ветряная оспа.